

Douleur thoracique

VITAL ← hospitalisation immédiate / préparer pour une RCP

Explications des VITAL FLAGS ↪ p. 17, parmi eux notamment: Ø 144

- Syncope
- Présyncope ou malaise/étourdissement (hypoperfusion cérébrale potentielle)
- Déficit neurologique:
 - Patient comateux (GCS ≤ 8, p. 59)
 - Convulsion
 - Déficit neurologique aigu (moteur, sensitif, nerfs crâniens)
 - État confusionnel aigu
- Douleur rétrosternale ± irradiation dans:
 - Abdomen
 - Dos
 - Cou, mâchoire
 - Nuque
 - Bras (gauche ou droit ou des deux côtés)
- Maladie coronarienne connue et douleurs semblables à celles ressenties lors d'un événement coronarien antérieur (infarctus du myocarde, angor)
- Transpiration, peau moite et pâle (DD: syndrome coronarien aigu)
- Dyspnée aiguë (DD: embolie pulmonaire massive, p. 66 ss) ↪ p. 93
- Les VITAL FLAGS suivants peuvent, selon la situation, être des RED FLAGS (DD: syndrome coronarien aigu, dissection aortique, embolie pulmonaire massive, pneumothorax sous tension, arythmie maligne):
 - Douleur d'apparition brusque
 - Douleur thoracique respiration-dépendante
 - Nausée et/ou vomissement ↪ p. 100
 - Palpitations ↪ p. 78
 - Facteurs de risque cardio-cérébro-vasculaires, p. 19
 - Antécédents de douleur thoracique à l'effort
 - Antécédents douleur thoraciques au repos
 - Risque modéré à élevé pour une maladie thromboembolique (TVP/EP; voir p. 63 ss)

RED FLAGS ← consultation médicale de suite (< 6 heures)

- Fièvre > 38.3°C ↪ p. 97
- Dyspnée légère à modérée ↪ p. 93
- Hémoptysie
- Médicaments/toxiques:
 - Inhibiteur de la PDE-5:
 - Avanafil SPEDRA®
 - Sildénafil VIAGRA®
 - Tadalafil CIALIS®
 - Vardénafil LEVITRA®
 - ± dérivé nitré
 - Cocaïne et autres substances cardiotoxiques